

Rossola bianca



OMTP988



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s141-145
OMtp988

4-5 A2
2 R9s141-145
Rossola bianca


FV. FH

3c


Rossola Bianca

1. (5A2)


2 R9s141-145














Année : 1987

Emplacement... 1.5 A.2 Désignation... Rossola bianca

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		31.3	3.4	7.4		
1	3	0	1	2 x		
2	3	1	2 x	3 x		
3	3	1	1	1		
4 } <i>feuille</i>						
5						

De 7.4.87 + 11

ANNEE 1989

NOM Rossola bianca
mi

EMPLACEMENT 2 Rg 141-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	18.3	21.3	0								
2	5	15.3	21.3	0								
3	4	15.3	21.3	0								
4	5	18.3	21.3	0								
5	4	18.3	21.3	0								
		<i>De 21.3</i>	<i>24</i>									
		<i>+ 3</i>	<i>89</i>									

Pourriture :

Mill. :

Port : *eng*

Vigueur : 2

DESIGNATION : *Rossola Bianca*

EMPLACEMENT : *1.5A2*

Date de la vendange : *16.9.88* *+4*

Poids de la vendange : *6,100 kg*

Nombre de souches : *2* *3050*

Nombre de grappes : *11* *554g*

Pourriture : *0*

Couleur : *BL*

Indice réfract. : *16,4* *900*

Acidité du moût : *1,7*

Date :

Pressurage

Densité :

Date : *23.9*

Mise en bouteille

Densité : *995*

Degré alcoolique : *9,5*

Acidité du vin : *6,0*

Date de Dégustation : *27 JAN. 1989*

OBSERVATIONS : *Note 1,83*

fromme

ANNEE *1991*

NOM *Rossola bianca*

ni

EMPLACEMENT *1 5 A2*

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	18,3	26,3	4	7	4,6	7,6	10,6	8,8	13,8	20,8	9,9
2	6	21,3	29,3	2								
3	2	-	29,3	4								
4	3	18,3	21,3	2								
5	4	18,3	21,3	2								
Grappe : G - M - P Dim : 15 Compacité: L - M - C												
Pour : 0 Mill : 0												
Baie : TG - G - M - P Dim : 16x15												
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus												
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré												
Saveur : s - m - ar - fox - herb												
Pépins : avec - apyrène												
Port : 1/2 Vigueur : 3 1/2												

De 26.3.91

+8

EMPLACEMENT 2 R9 s 141-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	16.3	19.3 ^a	3	5	21.5	24.5	27.5	3.8	16.8	17.8	14.9
2	4	16.3	19.3 ^a	1			+2			+3		+5
3	2	13.3	16.3 ^x	1		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :						
4	2	19.3	23.3 ^x	1								
5	2	13.3	16.3 ^x	1								

De 19.3.32
-1

EMPLACEMENT 15A2
2 R 9 s 141. 145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	30.3	5	g	26.5	30.5	2.6	3.8	10.8	17.8	21.9
2	4	30.3	2.4	1			+8			+3		+6
3	2	26.3	30.3	4								
4	4	19.3	30.3	4								
5	4	19.3	26.3	3								

Grappe : G - M - P Dim : 14 Compacité : L - M - C
Pour : 1 Mill : 0
Baie : TG - G - M - P Dim : 17 x 16
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

16 30.3 92
+10

ANNEE 1993

NOM Rossola bianca (1.5 A2) ni.

EMPLACEMENT 2 Rgs. 144-145 1.5 A2

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	2			0								
3	2			0								
4	4			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Rossola bianca ni.

EMPLACEMENT 1.5 A2 2 Rgs 144-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			9	10	30-5	3-6	6-6	2.8	9.8	16.8	6.9
2	4			8			+4			+3		+4
3	4			5								
4	6			5								
5	6			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : 0,5 Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : mi' enge' Vigueur : 35

^m
DESIGNATION : Rossola bianca
EMPLACEMENT : 15 A2
Date de la vendange : 9. 9. 94 (+4)
Poids de la vendange : 5,400
Nombre de souches : 2) 6g 2 Kg 700 Date de Dégustation : 17 FEV. 1995
Nombre de grappes : 12) 450g
Pourriture : 0 OBSERVATIONS : note 2,3 = 2
Couleur : Blanc
Indice réfract. : 16,6 90°
Acidité du moût : 4,5
Date :
Pressurage
Densité :
Date : 279 1.60
Mise en bouteille
Densité : 993
Degré alcoolique : 90°
Acidité du vin : 4.9

19 août 2004 Christophe Sereno

Rossola bianca :

Les 2 accessions présentes à l'ENTAV
proviennent de Vassel et sont identiques
morphologiquement.

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Rossola bianca
1-5 A 2 a. 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux (190) - sans villosité pubescente (278) - sans villosité
laineuse 279.
Blanc (191) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses (203) - cotonneuses (204) - sans villosité
pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.
Face supérieure : blanches (205) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) -
duveteux (218) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse (283).

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux (224) - cotonneux (225) - sans villosité pubescente (284) -
sans villosité laineuse 285.

A limbe (plan) - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à ~~plages bronzées~~ ^{le 231} ou cuivrées (231) - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux (237) -
duveteux (238) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse (287).

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Rossola bianca
1-5 A2 s. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 248 - sans villosité laineuse 249.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre :

Rossola bianca

Désignation :

1-5A2A.2

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : 15 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73).

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76).

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification (79).

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (84) - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 17 x 17).

De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore (105) - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).

A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).

A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).

A peau fine 135 - moyenne (136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

Rossola bianca

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

1-5 A 2 0-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (1) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoss

N° d'ordre :

Désignation : *Rossola bianca*

Emplacement : *2 R3. 111. 145 -*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 92

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3063

Année : 2010

Observateur :

Code cépage : 0Mtp988 \

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction : Rossola bianca \

Emplacement : Vass2R09s141-145

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	29/3	2/4	17	
2	f. Récepé (2)		(26/3)	(0)	
3	\		\	\	\
4	\		\	\	\
5	f. 2 Récepé		26/3	1 (petite)	
Moyenne	11		29/3	18	16

011

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			2/08	9/08	10/08	

bien avancé.

+3

+2

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3063

Année : 2010

Observateur :

Code cépage : 0Mtp988

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction : Rossola bianca

Emplacement : Vass1R02sP5A

Phénologie

→ Vass 2R9 s 141-145

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	29/3 <small>4/16 à 30/3</small>	1/4 <small>6 p. 29/3 à 2/4</small>	10	
2	\		\	\	\
3	\		\	\	\
4	\		\	\	\
5	11	26/3	30/03 <small>24/16</small>	6	
Moyenne	21		31/3	16	8

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			2/08	9/08	2/09	

+3

+1

Formulaire de description 4 / 8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2010

Observateur : *Laoume*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp988

Nom introduction : Rossola bianca

Emplacement : Vass2R09s141-145

LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	<u>Moyenne</u>	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	<u>3-Pentagon.</u>	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	<u>2-Trois</u>	3-Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vert moyen	<u>Vert foncé</u>	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	<u>1- Nulle</u>	2- Point pétiole	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	<u>1- Nulle</u>	2- Point pétiole	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	1-Plan	2-En V	<u>3-Involute</u>	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	Absente				<u>Présente</u>
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	<u>Moyenne</u>	<u>Forte</u>	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	<u>Forte</u>	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	<u>Moyenne</u>	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

PETIOLE

Oiv 090	Densité poils couchés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	<u>Égal</u>	Plus long	Beaucoup plus long
Vassal	Couleur du pétiole	1-coloré	<u>2-partiellement coloré</u>	3-vert		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	2- ouvert	3- peu ouvert	<u>4- fermé</u>	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		<u>1- Absence</u>	2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		<u>1- Absence</u>	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	<u>2- ouverts</u>	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence	<u>Peu profond</u>	<u>Moyens</u>	Profonds	Très profonds
Oiv 83-1	Forme		<u>1- en U</u>	2- en accolade	3- en V	
Oiv 83-2	Dent		<u>1- Absence</u>	2- Présence fréquente		

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	<u>2- côtés rectilignes</u>	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	<u>Petites</u>	<u>Moyennes</u>	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	<u>Moyennes</u>	<u>Longues</u>	Très longues

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	<u>Élevé (51-70%)</u>	Très élevé (>80%)
---------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-------------------

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp988

Nom introduction : Rossola bianca

Observateur : *TD sur Table*

Emplacement : Vass2R09s141-145

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : <i>16 cm</i>	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : <i>8 cm</i>	Très étroite (<5 cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe <i>grappe bec-de-danse</i>	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : 16 cm			Très courte ($<8\text{mm}$)	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue ($>26\text{mm}$)	
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : 14 cm			Très étroite ($<8\text{mm}$)	Etroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large ($>26\text{mm}$)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Uniforme				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc- ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme	1- Vert-jaune		2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	3- Uniforme				
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mince	Moyenne	Epaisse	Très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Apparent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2- Non déprimée				
Oiv 230	Coloration de la pulpe			1-Non colorée	2- Colorée				
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe			Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Forte coloration	Très forte coloration	
Oiv 232	Succulence de la pulpe			1- Peu juteuse	2- Juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)				Faible	Moyen	Elevé		
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faible	Moyenne	Elevée	Très élevée	
Oiv 236	Saveur			1-Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5-Autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle			Très court ($<4\text{mm}$)	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long ($>16\text{mm}$)	
Oiv 240	Séparation du pédicelle			Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile	

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : <u>6</u>	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	Très faible (<10mg)	Faible (25mg)	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010

Programme : GrapGene06

Nom introduction : Rossola bianca

Observateur : TD sur table

Code introduction : 0Mtp988

Emplacement : Vass1R02sP5A

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : 15cm	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 9cm	Très étroite (<5 cm)	Étroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Basé seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non coloré			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : 16 mm			Très courte ($<8\text{mm}$)	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue ($>26\text{mm}$)	
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : 16 mm			Très étroite ($<8\text{mm}$)	Etroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large ($>26\text{mm}$)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Uniforme				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc- ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme		1- Vert-jaune	2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	3- Uniforme				
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mince	Moyenne	Epaisse	Très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Apparent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2- Non déprimée				
Oiv 230	Coloration de la pulpe			1- Non colorée	2- Colorée				
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe			Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Forte coloration	Très forte coloration	
Oiv 232	Succulence de la pulpe			1- Peu juteuse	2- Juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)				Faible	Moyen	Elevé		
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faible	Moyenne	Elevée	Très élevée	
Oiv 236	Saveur			1- Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5- Autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle			Très court ($<4\text{mm}$)	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long ($>16\text{mm}$)	
Oiv 240	Séparation du pédicelle			Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile	

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7mm	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un p��pin (moy. de 100 p��pins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	Tr��s faible ($<10\text{mg}$)	Faible (25mg)	Moyen (40mg)	Elev�� (55mg)	Tr��s elev�� ($>65\text{mg}$)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale p��pins	1-Absentes	2-Pr��sentes			

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : ~~2010~~ 04/01/2016

Observateur : Mauchal

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp988

Nom introduction : Rossola bianca

Emplacement : Vass2R09s141-145

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur** * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 110 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 125 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »